

ЗАЩИТИ СЕБЯ ПРИВИВКОЙ!

ПЕРЕДАЮТСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ И ОЧЕНЬ ЗАРАЗНЫ:

ДИФТЕРИЯ

Острое инфекционное заболевание, вызываемое дифтерийной палочкой, преимущественно передающееся воздушно-капельным путем. Возможно заражение через инфицированные предметы быта, игрушки. Источник инфекции – больной человек. Заболеть дифтерией можно в любом возрасте.

Различают дифтерию ротоглотки, носа, гортани, глаз и др. На миндалинах образуются пленчатые налеты, ощущается боль при глотании, увеличиваются лимфатические узлы. Повышение температуры тела до 39-40°C, слабость, иногда рвота.

Заболевание опасно осложнениями на сердце, почки и др. органы. Возможна гибель не защищенных прививкой пациентов.

КОРЬ

В течение 3-7 дней после заражения, проявляются первые симптомы: температура до 41°C, озноб, частый мучительный, «лающий» кашель, насморк, воспаление слизистой глаз (конъюнктивит), вялость, головная боль, рвота.

Характерной особенностью для кори является появление мелкоточечной сыпи, которая, начиная с лица и шеи, быстро распространяется по всему телу. Возможные осложнения: пневмония, поражение глаз и др.

КРАСНУХА

Коварна обычно легким и бессимптомным течением заболевания. При типичном развитии болезни появляется мелкая пятнисто-папулезная сыпь на разгибательных поверхностях конечностей, спине и ягодицах.

Характерно увеличение заднешейных и заушных лимфоузлов. Может отмечаться незначительное повышение температуры до 37,5°-38,0°C.

Особенно опасна краснуха для беременных!

Беременность может закончиться выкидышем, рождением мертвого младенца или ребенка с множественными пороками развития («синдромом врожденной краснухи»).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

вступил в силу с 1 января 2002 г. (Приказ Министерства здравоохранения №229 от 27.06.2001 г.)

Возраст	Вакцинация и ревакцинация
ПРОТИВ ДИФТЕРИИ	
3 месяца	Первая вакцинация
4,5 месяца	Вторая вакцинация
6 месяцев	Третья вакцинация
18 месяцев	Первая ревакцинация
7 лет	Вторая ревакцинация
14 лет	Третья ревакцинация
Взрослые	Ревакцинация каждые 10 лет

Возраст	Вакцинация и ревакцинация
ПРОТИВ КРАСНУХИ	
12 месяцев	Вакцинация
6 лет	Вторая вакцинация
13 лет	Вакцинация не привитых ранее девочек

Возраст	Вакцинация и ревакцинация
ПРОТИВ КОРИ	
12 месяцев	Вакцинация
6 лет	Вторая вакцинация

СПб ГУЗ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»
ООО «Техно-центр», Заявка № 211 от 16.10.2007. Тираж 2000 экз.

Единственным надежным способом защиты от дифтерии, кори и краснухи является вакцинация!

